

# POTENCIATOR 5 G

ASPARTATO DE ARGININA

## COMPOSICIÓN

*Cada ampolla bebible contiene:*

Aspartato de arginina ..... 5 g  
Sorbitol solución al 70% .....2 g

Otros excipientes: Sacarosa, ácido cítrico monohidrato, sacarina de sodio, esencia de frambuesa, sorbato de potasio (E202), agua desionizada, parahidroxibenzoato de metilo (E218), parahidroxibenzoato de propilo (E216), c.s.

## FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Solución oral en ampollas bebibles. Envase con 20 ampollas.

## ACTIVIDAD

Los componentes de Potenciator son dos aminoácidos que participan en el restablecimiento de las reservas proteicas.

## TITULAR Y FABRICANTE

FAES FARMA, S.A.  
Máximo Aguirre, 14  
48940 Leioa

## INDICACIONES

Prevención de estados carenciales de aminoácidos por ingestión insuficiente de proteínas debido a regímenes vegetarianos, falta de apetito, convalecencias.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Insuficiencia renal o hepática grave.

## PRECAUCIONES

Las personas con problemas de retención urinaria, sólo lo tomarán bajo control médico. No tomar de forma continuada. En caso de agravamiento o persistencia de los síntomas, consultar al médico.

## INTERACCIONES

No se han descrito.

## ADVERTENCIAS

**Embarazo y lactancia**

### **IMPORTANTE PARA LA MUJER:**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Las mujeres en período de lactancia no deben utilizar este medicamento sin consultar al médico.

### **Efectos sobre la capacidad de conducción**

No se han descrito.

### **Advertencia sobre excipientes**

Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol por ampolla bebible. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

Por contener sorbato de potasio como excipiente es perjudicial para pacientes con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la administración oral, molestias de estómago y diarrea.

Este medicamento contiene 1,3 g de sacarosa por ampolla bebible, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

### **POSOLOGÍA**


Vía oral.

**Adultos:** la dosis usual de Potenciator 5 g es de 1 a 2 ampollas bebibles al día.


**Niños:** la dosis recomendada es de 1 ampolla al día.

Se pueden tomar diluidas en un poco de agua o zumo de frutas al final de las comidas principales.

### **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO**



1. Separar la ampolla.



2. Rasgar la lengüeta de la parte superior con un movimiento giratorio.



3. Después de invertirla, apretar la ampolla y verter el contenido en un vaso.

### **SOBREDOSIS**

La ingestión continuada o accidental de grandes dosis puede ocasionar molestias gastrointestinales (diarreas, náuseas, vómitos). Consultar al médico.

### **En cualquier caso:**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

### **REACCIONES ADVERSAS**

En algunos casos reacciones alérgicas. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

### **CADUCIDAD**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### **Sin receta médica.**

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.**